

直接経口抗凝固薬 DOAC（プラザキサ[®]、イグザレルト[®]、エリキュース[®]、リクシアナ[®]およびそれらのジェネリック医薬品）を服用されている方へ

田坂記念クリニックでは、夜間や祝祭日における内視鏡的止血術などの対応が困難なため、DOAC を服用されている方に対する内視鏡検査の際の観血的処置に関しては、以下の基準で対応しております。

1. 生検

検査前日までは、いつも通り服薬してください。検査当日は、服薬しないで来院してください。内視鏡検査時に生検しなかった場合は、検査を終了して水や食べ物を摂れるようになったら薬を服薬してください。内視鏡時に生検した場合は、検査当日は薬を飲まないで、検査翌日から薬の服薬を再開してください。但し、主治医から、「血栓症のリスクが高く、休薬してはいけない」といわれている方に関しては、当クリニックでは生検を行いません。生検が必要な場合は、高次医療機関へご紹介します。

2. 大腸ポリープ切除術

大腸ポリープを切除した場合は、出血の危険性があるといわれている検査後1週間は休薬していただく必要があります。多くの方は1週間の休薬は難しいと考えられますので、基本的には当クリニックでは DOAC を服用されている方に内視鏡的ポリープ切除術を行いません。高次医療機関へご紹介します。但し、主治医から1週間の休薬をしても構わないと許可をいただいた方に対しては、内視鏡的ポリープ切除術が可能ですので、照会状を記載してもらってきてください。

田坂記念クリニック 院長 加藤雅士

主治医 先生 御机下

ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当クリニックでは、内視鏡検査を行うにあたり、DOAC を服薬中の方に対しては、下記の書類をお渡しして対応しております。

直接経口抗凝固薬 DOAC（プラザキサ[®]、イグザレルト[®]、エリキュース[®]、リクシアナ[®] およびそれらのジェネリック医薬品）を服用されている方へ

田坂記念クリニックでは、夜間や祝祭日における内視鏡的止血術などの対応が困難なため、DOAC を服用されている方に対する内視鏡検査の際の観血的処置に関しては、以下の基準で対応しております。

1. 生検

検査前日までは、いつもどおり服薬してください。検査当日は、服薬しないで来院してください。内視鏡検査時に生検しなかった場合は、検査を終了して水や食べ物を摂れるようになったら薬を服薬してください。内視鏡時に生検した場合は、検査当日は薬を飲まないで、検査翌日から薬の服薬を再開してください。但し、主治医から、「血栓症のリスクが高く、休薬してはいけない」といわれている方に関しては、当クリニックでは生検を行いません。生検が必要な場合は、高次医療機関へご紹介します。

2. 大腸ポリープ切除術

大腸ポリープを切除した場合は、出血の危険性があるといわれている検査後1週間は休薬していただく必要があります。多くの方は1週間の休薬は難しいと考えられますので、基本的には当クリニックでは DOAC を服用されている方に内視鏡的ポリープ切除術を行いません。高次医療機関へご紹介します。但し、主治医から1週間の休薬をしても構わないと許可をいただいた方に対しては、内視鏡的ポリープ切除術が可能ですので、照会状を記載してもらってきてください。

さて、患者 _____ 様に関しましては、____月____日の内視鏡検査（□上部消化管検査、□下部消化管検査）にあたり、DOAC を中断することは可能でしょうか。お忙しいところ、大変恐縮でございますが、よろしく御教示の程お願い申し上げます（なお、この用紙にチェックをして患者様にお渡しいただき、検査当日に御持参くださいますよう御指示いただければ幸甚に存じます）。
田坂記念クリニック 加藤雅士

以下、主治医先生により、該当するところをチェックして、ご署名お願い申し上げます。

DOAC を中止することはできない（内視鏡検査は観察のみ）

生検程度（検査当日のみ休薬）であれば、休薬可能。

内視鏡的ポリープ切除術を受けることも可能（休薬期間8日間）

年 月 日 御施設名 _____ 御芳名 _____